

What You Need to Know About Monkeypox (MPX)



What is MPX?

Monkeypox is a viral infection transmitted through close personal contact, including kissing, sex, and other skin-to-skin contact.

What are symptoms of MPX?



Photo Credit:
UK Health Security Agency

- **Painful skin rash**
- Some people may experience:

 - **Fever**
 - **Headache**
 - **Muscle aches**
 - **Swollen Lymph Nodes**

Symptoms usually appear 5–21 days after exposure.



Photo Credit:
UK Health Security Agency



Photo Credit: NHS England High Consequence Infectious Diseases Network

What if I think I have MPX?

You should see your usual healthcare provider or visit an urgent care.

How do I get MPX?



MPX spreads between people primarily through direct contact with infectious sores, scabs; the highest risk is during intimate contact between people, including sex, kissing, or hugging and touching personal items that were used by a person with MPX, such as bedding and towels.

How can I prevent MPX?

- Avoid intimate contact with people recently diagnosed or who recently may have been infected.
- Be aware that MPX is spreading the most among people with multiple sex partners.
- Wear a face mask if you are in close contact with someone who has symptoms.
- Wash your hands with soap and water or use hand sanitizer, especially after coming into contact with those who are infected—or suspected infected.

For more information on MPX, please visit:

scdhec.gov/MPX

cdc.gov/monkeypox

Lo que debe saber acerca de la viruela del mono (MPX)



¿Qué es la viruela del mono?

La viruela del mono es una infección vírica que se transmite a través del contacto físico estrecho, como los besos, las relaciones sexuales y otros tipos de contactos piel con piel.

¿Cuáles son los síntomas de la MPX?



autor de la foto:
UK Health Security Agency

- **Sarpullido doloroso en la piel**

Algunas personas pueden presentar lo siguiente:

- **Fiebre**
- **Dolor de cabeza**
- **Dolor muscular**
- **Inflamación de ganglios linfáticos**

Los síntomas suelen aparecer entre 5 y 21 días después de la exposición.



autor de la foto:
UK Health Security Agency



autor de la foto: NHS England High Consequence Infectious Diseases Network

¿Qué debo hacer si creo que contraje la MPX?

Debe visitar a su proveedor de atención médica habitual o acudir a un centro de atención de urgencia.

¿Cómo contraigo la MPX?



La MPX se propaga entre las personas, principalmente a través del contacto directo con llagas o costras infecciosas. El riesgo más alto es durante el contacto íntimo entre personas, incluidas las relaciones sexuales, los besos o los abrazos, y al tocar objetos personales que utilizó una persona con MPX, como ropa de cama y toallas.

¿Cómo prevenir la MPX?

- Evite el contacto íntimo con personas diagnosticadas recientemente o que puedan haberse infectado hace poco.
- Tenga en cuenta que la MPX se está propagando más entre personas con varias parejas sexuales.
- Utilice una mascarilla si tiene contacto cercano con alguien que presenta síntomas.
- Lávese las manos con agua y jabón o utilice desinfectante para las manos, especialmente después de estar en contacto con personas infectadas (o con sospecha de infección).

Para obtener más información sobre la MPX, visite el siguiente sitio:

scdhec.gov/MPX

cdc.gov/monkeypox